

HEDWIGIA.

Organ für Kryptogamenkunde

Repertorium für kryptog. Literatur.

Redigirt von Prof. Dr. K. Prantl.

1891. September u. October. Heft 5.

Lichenes Schenckiani.

a cl. Dr. H. Schenck, bonnensi, in Brasiliae orientalis prov. Sta. Catharina, Parana, Rio de Janeiro, Minas Geraes et Pernambuco lecti, quos determinavit

Dr. J. Müller (Müll. Arg.).

Loci natales frequentius citati, ut Campi das Antas, São Antonio, São Bento, Blumenau, Desterro, Flaggenberg, ins. Gamboa, Joinville, Theresopolis, in prov. Sta. Catharina; — Paranaguá in prov. Parana; Congonhas do Campo, Itacolunni, Ouro Preto, Queluz, in prov. Minas Geraes; — Cabo Frio, Copacabana, Betingu Maus, Lago do Rodrigo de Freitas, in prov. Rio de Janeiro; — et Garanhuns in prov. Pernambuco sibi sunt.

Trib. Collemae.

1. *Physma byrsinum* Mass. Neag. p. 9; truncicola in Corcovado: n. 4616, et prope Theresopolin: n. 4638.
2. *Leptogium bullatum* Nyl. Syn. p. 129; arboricola ad Theresopolin: n. 4635, et prope Blumenau: n. 4629.

3. *Leptogium* (s. *Stephanophorus*) *phyllocarpum* Montg. Sylloge p. 379; frequens ad truncos arborum prope Theresopolin: n. 4471, 4472 pr. p. 4636.
- v. *macrocarpum* Nyl. Syn. p. 130, ad terram muscosam in fruticetis in Serra do Picu: n. 4455.
4. *Leptogium* (s. *Stephanophorus*) *chloromelum* Nyl. Syn. p. 128; ad Rodico: n. 4478.
5. *Leptogium punctulatum* Nyl. in Fourn. Miss. scient. au Mexique p. 1; Wainio Etude I. p. 222; ad frutices et truncos arborum in Serra do Picu: n. 4456.
6. *Leptogium foveolatum* Nyl. Syn. p. 124; ad truncos muscosos arborum infra Campos das Antas: n. 4634, mixtum cum *L. tremelloide* Fr.
7. *Leptogium tremelloides* Fr. Scan. p. 293; ramicola prope Joinville: n. 4632.
- f. *isidiligera* Müll. Arg.; in silvis primitivis ad Joinville: n. 4640.
- f. *lobuligera* Müll. Arg.; thalli lobi (siccatione rufo-fusci) in pagina supra copiose microphyllini; in silvis prope Joinville: n. 4631.
- v. *aureum* Nyl. Syn. p. 135; in Serra dos Orgaos: n. 4630; ad Paranaguá: 4633; prope Blumenau: n. 4639.
8. *Leptogiopsis adpressa* Müll. Arg. L. B. n. 372; truncicola ad Theresopolin: n. 4472.
9. *Synechoblastus nigrescens* Anzi v. *caesius* (Ach.) Müll. Arg. L. B. n. 376; ad ramos arborum prope Theresopolin: n. 4637.

Trib. Sphaerophorae.

10. *Sphaerophoron compressum* Ach. Meth. p. 135; truncicola prope Theresopolin: n. 4529 (ster).
11. *Sphaerophoron australe* Laur. in Linnaea 1827 p. 44; in fruticetis infra Campos das Antas: n. 4641 (ster).

Trib. Baeomyceae.

12. *Gomphillus calicioides* Nyl. Prodr. p. 146; supra muscos emortuos ad saxa prope Theresopolin: n. 4541.
13. *Baeomyces erythrellus* (Montg.) Nyl. Syn. p. 181; ad litora viae inter Bananal et Theresopolin: n. 4650.
14. *Baeomyces absolutus* Tuck. Suppl. 2. p. 201 v. *subsessilis* Tuck. l. c.; supra terram argillaceam ad saxa et vias prope Blumenau: n. 4669.

Trib. Cladonieae.

15. *Stereocaulon mixtum* Nyl. Syn. p. 238; saxicola, frequens in Serra dos Orgaos: n. 4519, et in Serra do Picu: n. 4521.

- — *v. tenellum* Müll. Arg. L. B. n. 167; in Serra do Mar: n. 4518b, in Serra do Picu: n. 4522, et valde frequens ad saxa in Serra dos Orgaos: n. 4519b.
16. *Stereocaulon proximam* Nyl. Syn. p. 207 (at *St. ramulosum* Ach. certe in hoc transit); saxicola prope Theresopolim: n. 4519, 4520.
- — *v. gracillius* Müll. Arg. Lich. Nov. Graen. n. 8; saxicola prope Joinville in Serra do Mar: n. 4518.
- — status ferruginascens, podetia et ramis phyllocladiaeque, excepto apice albicante, ferruginascentibus. Reliqua omnia quadrant. — In saxosis micaceo-schistosis ferreis ad Ouro Preto: n. 4523.
17. *Clathrina aggregata* (Eschw.) Müll. Arg. L. B. n. 589; saxicola in Serra do Picu: n. 4447, prope Theresopolim: n. 4505, in Campis das Antas: n. 4504; ad terram in Serra do Ouro Branco: n. 4503b, Ouro Preto: n. 4506, et in summo cacumine montis Itacolomi: n. 4503.
18. *Cladonia pycnocarpa* Nyl. Lich. Nov. Caled. p. 11; in editoribus saxosis Serrae do Picu: n. 4567; Serra do Ouro Preto: n. 4554; 4559b, in monte Flaggenberg: n. 4562.
- — *v. flavida* Wainio Monogr. Clad. p. 38; ad saxa sicca granitica prope São Antonio in ins. Sta. Catharina: n. 4564.
19. *Cladonia rangiferina* Web. *v. crispata* Nyl. in Flora 1869 p. 117; in saxosis prope Theresopolim: n. 4561, et in altioribus Serrae do Picu: n. 4568.
20. *Cladonia peltastica* (Nyl.) Müll. Arg. L. B. in Flora 1880; ad saxa prope Theresopolim: n. 4556, et in Serra do Ouro Branco: n. 4557.
21. *Cladonia periricosa* Krph. Lich. Austral. u. 14; *Cl. furcata v. filiformis* Müll. Arg. L. B. n. 381; *Cl. peltastica* Wainio Monogr. Cladon. p. 294 (excl. syn.); praeter colorem albidum *v. glauco* — *v. fuscescenti* — albidum (nec stramineum) omnibus partibus simillima est *Cl. peltastica* (Nyl.) Müll. Arg., at minor, vulgo 2—3 cm tantum alta (dichotome divisa, tenella), proxime affinis *Cl. Gorgoninae* Wn. — Supra saxa in Serra do Ouro Preto: n. 4555 (nec non in Java et Nova Hollandia).
22. *Cladonia Gorgonina* Wainio Monogr. Clad. p. 306; supra saxa sicca silvatica ad São Antonio: n. 4560; ad terram sabulosam in Restinga Maua: n. 4563, ad Cabo Frio: n. 4563b, et dein frequenter in Serra do Ouro

- Preto: n. 4558 pr. p., 4559, 4524b. pr. p., in Serra dos Orgaos: n. 4565 pr. p.
- — *β turgidior* Wainio Monogr. Clad. p. 310; Serra do Ouro Branco: n. 4566, Ouro Preto: n. 4558 pr. p.
- — *γ nutana* Wn. l. c.; Campos das Antas: 4565 pr. p. (podetium unicum lectum).
23. *Cladonia furcata* Schrad. *v. cymosa* Flk. Clad. p. 144; Campos das Antas: n. 4532.
24. *Cladonia squamosa* Hoffm. D. flor. p. 125; in saxosis Serrae do Picu: n. 4445.
- — *v. squamosissima* Flk. Clad. p. 132; Serra do Picu: n. 4446.
- — *v. cuspidata* Müll. Arg.; podetia 1½—3 cm alta, ½—1½ mm lata, rigidula, undique scorticata, sterilia in ramos paucos patentes cuspidato-subulatos superne pares et minute granulato-squamulosos *v. subulatos* abeuntis, caeterum medio et inferne sat copiose squamosa, fertilia magis simplicia et undique copiose squamosa et granuloso-squamulosa, apice in scyphum radiatodivium centro pervium terminata; ramuli scyphorum abbreviati, conglomerato-polycarpici; axillae superiores non hiantes. — Sterilis subsimilis est *Cl. fimbriatae v. subulatae* Schaer., sed rami divergenter patentes, minus albi et fertilius apothecia affinitatem clare indignant. Ad saxa humida secus Aqueductum in monte Corcovado: n. 4535.
25. *Cladonia Uleana* Müll. Arg. Lich. Catharinens. n. 13; ad terram secus vias prope Blumenau: n. 4538.
26. *Cladonia verticillaris* Montg. in Ann. Sc. nat. 2. XII. p. 48; ad terram sabulosam et ad saxa, in Restinga Maua, Serra dos Orgaos, Serra do Picu, Serra do Ouro Preto et in cacumine montis Itacolomi: n. 4524a, b, d, f, g, h.
- — *v. calycantha*; *Cladonia calycantha* Nyl. Syn. p. 192; in monte Itacolomi et in Serra do Ouro Preto: n. 4525c, e.
27. *Cladonia ceratophylla* Eschw. Bras. p. 280; Müll. Arg. L. B. n. 232; in monte Flaggenberg prope Desterro: n. 4537, ad Joinville: n. 4536; in Serra do Picu: n. 4553.
28. *Cladonia degenerans v. pleolepis* Flk. Clad. p. 45; supra saxa prope Theresopolim: n. 4552, in Campis das Antas: n. 4534.
29. *Cladonia cariosa* Flk. Clad. p. 11 (forma podetia non cancellatis); supra saxa in Campis das Antas: n. 4533.

30. *Cladonia cartilaginea* Müll. Arg. L. B. n. 169, v. *polyccephala* Müll. Arg.; minor (quam forma primitiva), podetia superne corymbulose micro-polyccephala. — Apothecia ut in *Cl. corymbulosa* Nyl., sed podetia non corticata, caeterum nuda aut varie squamulosa aut granuloso-squamulosa. Color apotheciorum ut in *Cl. mitrula* Tuck. — Crescit locis saxosis apertis ad pedem meridionalem montis Corcovado: n. 4531.
31. *Cladonia insignis* Nyl. Syn. p. 219; ad ramillos dejectos in arenosis maritimis Itajahy: n. 4608 (forma verisimiliter aqua marina obfusa facta, parcissime fertilis).
32. *Cladonia pleurota* Schaer. Enum. p. 186, supra saxa in Campis das Antas: n. 4526.
33. *Cladonia miniata* Meyer Entwickl. Fl. p. 149; ad truncos siccos Vellosiae in Serra do Ouro Branco: n. 4525c, Campos das Antas: n. 4525d, et ad saxa montis Itacolumi: n. 4525a.
- v. *anaemica* Wainio Monogr. Clad. p. 64; ad saxa montis Itacolumi: n. 4525b.
34. *Cladonia muscigena* Eschw. Bras. p. 262; prope Joinville: n. 4539, in Restingis Maua: n. 4521.
- f. *polydactyloides* Müll. Arg. L. B. n. 388; inter caespites *Selaginellae rupestris* ad Lago de Rodrigo de Freitas: n. 4438.
- v. *pulchella* (Schwein.) Tuck. in Willey Cat. p. 18; ad terram sabulosam supra saxa in Serra do Ouro Preto: n. 4527, supra saxa granitica prope Desterro: n. 4540.

Trib. *Usneae*.

35. *Usnea barbata* v. *florida* Fr. Lich. europ. p. 18; Serra do Pico: n. 4448 pr. p., 4449 pr. p., prope Blumenau: n. 4495 pr. p.
- — stat. *rubescens*, tota ferrugineo-rubescens; ad frutices in Serra do Pico: n. 4448 pr. p.
- v. *sorediifera* Arn., arboricola prope Blumenau: n. 4495b, 4495 pr. p.
- v. *comosa* Wn. Etude I. p. 3; *Lichen comosus* Ach.; *U. barbata* v. *aspera* Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 2; arboricola ad Sitio: n. 4494 pr. p., prope Queluz sub eod. numero, Campos das Antas: n. 4460, ad Theresopolim: n. 4458 b, in monte Corcovado: n. 4458.
- Haec var. libenter transit hinc in var. *floridam*, illic in var. *strigosam*.

- — — stat. *subrubiginosa*; tota plus minusve ferrugineo-rubescens; Congonhas do Campo: n. 4494c pr. p., prope San Antonio: n. 4499, in insula Gamboa: n. 4500 pr. p. (haec specimina alcoholico rufis-tincta, ex obs. egreg. collectoris), et supra Joinville ad ramos *Araucariarum*: n. 4496 pr. p., prope Itajahy: n. 4498 pr. p.
- v. *Cinchonarum* (Fée) Müll. Arg. L. B. n. 1065; ramulicola prope Blumenau: n. 4495c.
- v. *australis* (Fr.) Müll. Arg. L. B. n. 1066, supra Joinville in *Araucariis*: n. 4496 pr. p.
- v. *hirta* Fr. L. Europ. p. 18; ramicola ad Congonhas do Campo: n. 4494c pr. p., ad frutices prope Lagoa de Rodrigo de Freitas: n. 4440, in Corcovado: n. 4458 pr. p., in Serra do Pico: n. 4449 pr. p., prope Blumenau: n. 4495 pr. p.
- v. *elegans* (Surt.) Müll. Arg. L. B. n. 1476; saxicola in monte Itacolumi: n. 4486.
- v. *microcarpoides* Müll. Arg. L. B. n. 1476; ad frutices prope Garanhuns: n. 4492; prope Blumenau: n. 4495 pr. p.
- v. *xanthopoga* Müll. Arg. L. B. n. 1476; Alto da Serra do Ouro Branco, saxicola: n. 4488.
- v. *strigosa* Krmph. Lich. exot. p. 312; in Corcovado: n. 4491, ad Sitio: n. 4494 pr. p., prope Queluz sub eod. numero, et sub n. 4494b, prope Desterro: n. 4444, et in Serra do Pico: n. 4449 pr. p.
- — stat. *ferrugineo-rubescens*, tota aut saltem partes crassiores plus minusve ferrugineo-rubescens. — Ramicola ad Congonhas do Campo: n. 4494c pr. p., in ins. Gamboa: n. 4500 pr. p.
- v. *densirostra* (Tayl.) Müll. Arg. L. B. n. 234; ad saxa granitica in Campos das Antas: n. 4461, et in Serra Asperazas in prov. Rio Grande do Sul: Schwacke: n. 4493.
- v. *trachyclada* Müll. Arg.; thallus flavido-glaucus, implexo-erectus, 6—8 cm altus, irregulariter ramosus; rami primarii crassi, molliusculi, teretes et angulosi, superficie scrobiculato-inaequales v. laeviusculo-impressi et simul crebre prominenter soredioso-asperis et parce subfasciculatim setulosis. — Quasi v. *hirta* crassa, ramis angulosis. — In caulibus *Vellosiarum*, Serra do Ouro Branco: n. 4487.
- v. *scabrosa* Müll. Arg. Lich. Nov. Gran. 20; ad *Araucarias* supra Joinville: n. 4496 pr. p. (specim. olivaceo-fuscula).

- v. asperissima Müll. Arg. L. B. n. 390; saxicola prope Theresopolin: n. 4463.
- v. dasypoga Fr. Lich. europ. p. 18; arboricola ad Queluz: n. 4494 pr. p.
- — stat. fusco-rufa; tota fusco-rufa; ad frutices in maritimis Itajahy: n. 4498 pr. p.
- 36. *Usnea plicata* Hoffm. D. Flor. p. 132; ad saxa cacuminis montis Corcovado: n. 4475.
- v. scabra Müll. Arg.; rami et ramuli minute et crebre verruculoso-aspera v. apice laeves, primarii hinc inde laevigati. — Tota olivaceo-fusca. — Supra Joinville ad Araucarias: n. 4496 pr. p.
- 37. *Usnea arthroclada* Fée v. aspera Müll. Arg.; *Usn. intercalaris* Waie. Etude I. p. 10, non Krph.; rami vulgo esorediosi et minus longe et minus acute acuminati, verruculoso-aspera et subnodulosi, spiculis et glaucedine destituti. — Arboricola prope Theresopolin: n. 4459, ad truncos Araucariarum in Serra do Picu: n. 4451 (magis sorediosa et ramilli abbreviati).
- v. spinulosa Müll. Arg.; rigidula, tota cinereo-v. fere caesio-pruinosa, rami laeves, ramilli sparsa tuberculoso-aspera et spinuligeri. — Rami crassiores tantum hinc inde crebre articulati. — Saxicola prope Joinville: n. 4497, et in Araucariis supra eandem urbem: n. 4496 pr. p.
- 38. *Usnea dasypogoides* v. exasperata Müll. Arg. Lich. Kilim.; saxicola in Serra do Picu: n. 4450.
- 39. *Usnea angulata* Ach. Syn. p. 307; arboricola prope Sitio: n. 4494 pr. p.
- 40. *Usnea laevis* Nyl. Syn. p. 271, v. aspera Müll. Arg.; *Usn. aspera* Wn. Etud. p. 7 (excl. syn. Müll. Arg.); saxicola in summo cacumine montis Itacolami: n. 4490, in Serra do Ouro Branco: n. 4484, et ad Campos das Antas: n. 4462.
- v. implexa Müll. Arg.; thallas ut in v. aspera, at subdecumbens, e basi intricatim implexo-ramosus, rami longius filiformi-attenuati; cum praecedente in monte Itacolami: n. 4490 pr. p., 4489, ad truncos Vellozianum in Serra do Ouro Branco: n. 4485. — Varietates ambae ab *Usn. laevi* Nyl. specificis non differunt. Apothecia in iisdem caespitibus ludunt margine nuda et plus minusve ciliata, dorso plus minusve papilloso-aspera; rami primarii undique v. longo tractu saltem valide papilloso-aspera, superne vulgo laeves, copia ramulorum eximie varii. Quod olim in Revis. Lich. Mey. p. 309 pro *Parmelia coralloide* v. *aspera* Eschw. Bras. p. 227,

a me non visa, habui, ad *U. barbata* v. *asperam* Müll. Arg. pertinet.

Trib. Ramalinae.

- 41. *Ramalina dendriscoidea* Nyl. in Flora 1876 Ram. cub. n. 4; ramulicola ad Garanhuns: n. 4501, Cabo Frio: n. 4438 cum fr., prope Desterro: n. 4442.
- v. minor Müll. Arg. Diagn. Lich. ins. Socotr. p. 2; ad muro prope Desterro: n. 4443.
- 42. *Ramalina gracilis* Nyl. Syn. p. 296, *R. maculata* Müll. Arg. L. B. n. 64 (spermogon. nunc nota nigra sunt ut in *R. gracili* Nyl.); ramulicola ad Lagoa de Rodrigo de Freitas: n. 4438 pr. p., et secus Itajahy prope Desterro: n. 4436, 4438 b.
- 43. *Ramalina camptospora* Nyl. Recogn. Ram. p. 22; corticola in monte Corcovado: n. 4479.
- 44. *Ramalina Sintenesii* v. polyclada Müll. Arg. Lich. Portor. n. 17 (ster.); ad saxa maritima Cabo Frio: n. 4503.
- 45. *Ramalina usneoides* Fr. L. Europ. p. 468; ad frutices in Restinga ad Lagoa de Rodrigo de Freitas: n. 4438, et similiter ad Cabo Frio et Copacabana sub eod. num.
- v. tenuis Nyl. Recogn. Ramal. p. 24; ad Araucarias supra Joinville, loco São Bento: n. 4512, ster. — Specimina actione alcoholica pr. p. colore rufo-fusco tincta.
- 46. *Ramalina complanata* Ach. Un. p. 599 (incl. *R. denticulata* Nyl. Recogn. Ramal. p. 28); ramuli-ramulicicola, ad Garanhuns: n. 4509 pr. p., prope Rio de Janeiro, in horto botanico, ad Cabo Frio, Copacabana, Lagoa de Rodrigo de Freitas, omnes 4 sub n. 4441, et prope Desterro n. 4441 et 4510.
- 47. *Ramalina subpollinaria* Nyl. Recogn. Ramal. p. 27; ad frutices in Restinga circa Cabo Frio: n. 4441 pr. p., et prope Garanhuns: n. 4509 pr. p.
- 48. *Ramalina sorediantha* Nyl. Recogn. Ram. p. 45; ad frutices prope Garanhuns: n. 4509 pr. p.
- 49. *Ramalina Eckloni* Montg. in Cl. Gay Flor. Chilena 2 p. 79; *R. Yemensis* Nyl. Ram. p. 46; ramulicola ad Queluz: n. 4515, secus Itajahy prope Blumenau: n. 4514.
- v. membranacea (Laur.) Müll. Arg. L. B. n. 818; ad Sitio: n. 4515, et prope Theresopolin: n. 4516.
- 50. *Ramalina inflata* Hook. f. et Tayl. in Hook. f. Flora Antaret. p. 194; ramicola prope Sitio: n. 4513.

Trib. *Peltigereae*.

51. *Peltigera americana* Wainio Et. II. p. 179; prope Theresopolin et Campos das Antas: n. 4613a, b.
52. *Peltigera polydactyla* Hoffm. D. Flor. 2. p. 106; ad terram in Serra do Picu: 4614b, et ibidem ad Barra: n. 4614.

Trib. *Parmelieae*.

53. *Stictina tomentosa* Nyl. v. *impressula* Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 537; arboricola ad Queluz: n. 4592, et in Serra do Picu: n. 4454.
54. *Stictina quercizans* Nyl. Syn. p. 344; *Sticta Weigelii* Wn. Etud. I. p. 190; prope Joinville: n. 4602, 4609, Blumenau: n. 4464, 4465, 4596b, et dein prope Theresopolin: n. 4588.
 - v. *peruviana* Nyl. Syn. p. 345; ad saxa prope Theresopolin: n. 4591, 4591b.
 - v. *Beauvoisii* (Del.) Müll. Arg. L. Nov. Gran. n. 32; ad saxa juxta cateractam prope Desterro: n. 4606, et ad truncos arborum prope Theresopolin: n. 4590.
 - v. *ciliata* Müll. Arg. L. B. n. 397; ad truncos muscosos prope Theresopolin: n. 4571.
 - v. *leucoblephara* Müll. Arg.; pallida et tenuis, impresso-punctata, ad margines albo-ciliata. — Videtur filia umbrarum. — Arboricola prope Theresopolin: n. 4571b.
55. *Sticta laciniata* v. *laeviuscula* Nyl. Syn. p. 354; truncicola prope Desterro: n. 4600, prope Blumenau: n. 4596, et circa Theresopolin: n. 4571f.
56. *Sticta damacornis* Ach. Meth. p. 276; truncicola, Campos das Antas: n. 4571d, São Bento: n. 4599, São Antonio: 4600b.
 - v. *dichotoma* Nyl. Syn. p. 357, truncicola ad Theresopolin: n. 4571e.
57. *Sticta sinuosa* Pers. in Gaudich. Uran. p. 199; arboricola in monte Corcovado: n. 4597, prope Theresopolin: n. 4571e.
58. *Sticta aurata* Ach. v. *laetevirens* Müll. Arg. L. B. n. 98; truncicola prope Joinville: n. 4580, 4598.
 - v. *impressa* Müll. Arg. L. B. n. 178; *Pseudocypripellaria aurora* Wainio Etud. I. p. 184 (excl. syn. De Not.); truncicola ad Paranaguá: n. 4601, Joinville: n. 4615, et prope Theresopolin: n. 4569.
59. *Sticta aurora* De Not. Stict. p. 9; truncicola prope Theresopolin: n. 4572, et in Serra do Picu (sine n.)

60. *Sticta glaberrima*; *Ricasolia glaberrima* De Not. Stict. p. 16. Fig. 15. Nyl. Syn. p. 367, ad frutices in Serra do Picu: n. 4574.
61. *Sticta erosa* Tuck. North Amer. Lich. p. 93; *Parmelia erosa* Eschw., *Lobaria quercizans* Wainio Etud. I. p. 195 (excl. syn. Mich., et Ach. ex descript. fere omnino alia); ad truncos arborum prope Theresopolin: n. 4570.
 - v. *aequalis*; *Lobaria quercizans* v. *aequalis* Wainio Et. I. p. 196; arboricola in Serra do Ouro Preto: n. 4593.
62. *Parmelia latissima* Fée f. *isidiosa* Müll. Arg. L. B. n. 190; prope Blumenau: n. 4466. pr. p.
63. *Parmelia subrugata* Krph. L. Exot. p. 320; Wainio Etud. I. p. 81; truncicola prope Theresopolin: n. 4585. pr. p.
64. *Parmelia melanothrix* Wain. Et. I. p. 80; *P. crinita* Auct. non Ach.; ad Queluz: n. 4595b. pr. p.
 - v. *argentina* Müll. Arg.; *P. argentina* Krph. Lich. Argent. n. 32; ad Sitio: n. 4595b. pr. p., prope Theresopolin: n. 4582.
65. *Parmelia arceolata* Eschw. in Mart. Icon. sel. p. 23. t. 13. Fig. 1; in fruticetis Restinga ad Cabo Frio: 4573.
 - v. *nuda* Müll. Arg. L. B. n. 183; ad frutices, Desterro: n. 4610.
66. *Parmelia tinctorum* Nyl. Obs. in Pyr. Or. p. 16; *P. praetervisa* Müll. Arg. L. B. n. 191; truncicola prope Blumenau: n. 4466. pr. p., ad Desterro: n. 4603.
67. *Parmelia perlata* v. *ciliata* DC. Flore fr. 2. p. 408; saxicola in Serra do Ouro Preto: n. 4594.
68. *Parmelia acanthifolia* Pers. in Gaudich. Uran. p. 197; prope Theresopolin: n. 4585 pr. p., ad Desterro: n. 4604, 4610 pr. p.
69. *Parmelia perforata* Ach. Univ. p. 459; ad saxa granitica in maritimis prope Desterro: n. 4611 c. fr.
70. *Parmelia cetrata* Ach. Syn. p. 198; ad saxa in Serra do Picu: n. 4578 (ster.).
 - f. *sorediifera* Wn. Et. I. p. 40; arboricola prope Blumenau: n. 4607 (ster.).
 - v. *corniculata*; *P. perforata* v. *corniculata* Krph. Lich. Warm. p. 16; truncicola in monte Corcovado: n. 4482.
71. *Parmelia xanthina* (Wainio) Müll. Arg. v. *subciliata* Müll. Arg.; *P. conformata* Wn. Et. p. 36 (excl. Syn. Müll. Arg.); lacinae thalli non v. raro tantum et obsoletius ciliatae. — *P. xanthina* Wn.,

- P. conformata* et *P. delicatula* ejusd. l. c. p. 35, 36e. descriptionibus nequaquam legitime differunt et exceptis reactionibus et ciliis et isidiis praesentia aut absentia non differunt, unde omnes 3 conjunctim *P. xanthinam* constituent. — Primitiva *P. proboscidea* v. *xanthina* Müll. Arg. L. B. n. 809 sit nunc *P. xanthina* f. *isidiosa* Müll. Arg. — Supra saxa granitica in maritimis prope Desterro: n. 4612, ster., intime mixta cum *P. perforata* Ach.
72. *Parmelia laevigata* Ach. Syn. p. 212; ad saxa Camporum das Antas: n. 4581 (ster.).
- v. *ceratina* Müll. Arg. L. B. n. 186; *P. exsecta* Tayl. in Hook. Journ. of Bot. 1847, p. 168; supra muscos in Serra do Picu: n. 4576 (ster.).
73. *Parmelia microsticta* Müll. Arg. L. B. n. 100; saxicola in Serra dos Orgaos: n. 4587, et ad terram et frutices in Serra do Picu: n. 4579.
74. *Parmelia Kamtschadalis* v. *americana* Nyl. Syn. p. 387; ad terram inter muscos in Serra do Picu: n. 4452 pr. p.
- v. *tenuis* Müll. Arg. Lich. Nov. Gran. n. 43; ad saxa et ad truncos arborum infra Campos das Antas: n. 4502, prope Theresopolin: n. 4502b. (ster.) et in Serra do Picu: n. 4452 pr. p.
75. *Thelosehastes flavicans* Norm. Const. praem. p. 17; supra saxa granitica maritima prope Desterro: n. 4437, pr. p.
- v. *croceus* Müll. Arg. Lich. Portoric. n. 29; cum praecedente: n. 4437 pr. p.
- v. *tenuissima* (Mey. et Flot.) Müll. Arg. Revia. Lich. Mey. n. 5; prope Itajahy: n. 4437 pr. p., prope Desterro: sub. eod. num.
- v. *intermedius* Müll. Arg. Revia. Lich. Mey. n. 5; ad arbores prope Theresopolin: n. 4437, ad Paranaguá: n. 4473, supra Lagoa do Rodrigo de Freitas: n. 4437, in Serra do Picu in muscos: n. 4453, ad Garanhuns: n. 4517.
- v. *melanotrichus* Müll. Arg. Revia. Lich. Mey. n. 5; ramicola in Corcovado: n. 4437, ad Cabo Frio et Copacabana: sub. eod. num.
- v. *aeromelas* Wn. Et. l. p. 115; ramicola prope Queluz: n. 4437.
- v. *exilis* Müll. Arg. Lich. Nov. Gran. n. 40; ramicola prope Theresopolin: n. 4437, Copacabana et prope Desterro: sub. eodem num.

76. *Anaptychia leucomelaena* Trev. in Flora 1861. p. 52; ad arbores prope Paranaguá: n. 4507c. Blumenau: n. 4507, Queluz: 4507b., ad Theresopolin: n. 4507d.
- v. *ophioglossa* (Tayl.) Müll. Arg. L. B. n. 1348; ramicola prope São Bento: n. 4507b.
- v. *multifida* Wn. Et. p. 129; ad terram muscosam in Serra do Picu: n. 4507 pr. p. et ramicola ad São Bento: n. 4507b.
77. *Anaptychia pudocarpa* Trev. in Flora 1861 p. 52; ramicola prope Theresopolin: n. 4436a pr. p.
78. *Anaptychia comosa* Trev. in Flora 1861. p. 52; ramicola in Serra do Ourv Preto: n. 4436h., ad São: n. 4436g.; prope Theresopolin: n. 4436e., ad Cabo Frio: n. 4436d., in Serra do Picu: n. 4436f.; ad Desterro: n. 4436b., et prope Blumenau: n. 4436.
79. *Anaptychia speciosa* Wn. Etude l. p. 135; Corcovado: n. 4477.
- v. *hypoleuca* (Nyl. Syn. p. 417 sub *Physcia*); truncicola prope Theresopolin: n. 4583; secus Itajahy: n. 4505.
- f. *sorediifera* Müll. Arg. Lich. costar.; inter muscos in Serra do Picu: n. 4577, secus viam inter Baanal et Theresopolin: n. 4584.
- v. *diademata* Müll. Arg. L. B. n. 193; in Serra dos Orgaos: n. 4586.

Trib. **Pyxineae.**

80. *Pyxine Coccis* Nyl. Lich. Bourb. p. 255; truncicola in monte Corcovado: n. 4480.

Trib. **Pannariae.**

81. *Erioderma Wrightii* Tuck. Suppl. l.; truncicola prope Theresopolin: n. 4589.
82. *Pannaria rubiginosa* Del. in Diet. class. XIII. p. 20 (ex Nyl. Prodr. p. 66); corticola prope Theresopolin: n. 4658.

Trib. **Coccocarpiceae.**

83. *Coccocarpia pellita* Müll. Arg. L. B. n. 421, v. *parmelioidea* Müll. Arg. l. c.; ad rupes madidas in monte Corcovado: n. 4481.
- v. *cronia* Müll. Arg. l. c., ad saxa in Serra dos Orgaos: n. 4473.
- v. *smaragdina* Müll. Arg. l. c.; ramicola ad Theresopolin: n. 4474, 4617, ad Rodcio: n. 4476, et in Serra do Picu: n. 4457.

- *v. isidiophylla* Müll. Arg. L. B. n. 421; ad saxa submuscosa prope Theresopolin: n. 4620.
- *v. blepharocarpa* Müll. Arg.; laciniae cuneato-obovatae, crenatae, tenues, e viridi-olivaceo demum nigrescentes *v. fuscae*, supra non isidiosae; apothecia fusco-aurantiaca, adpressa, demum margine lobata, extus pilis albido-chryseis crebre ciliolata. — *A. v. smaragdina* recedit apotheciis ciliatis. — Ad truncos arborum prope Joinville: n. 4623, 4623b.

Trib. Lecanoreae.

- 84. *Lecanora subfusca v. subgranulata* Nyl. Lich. Nov. Caledon. p. 26; lignicola prope Blumenau: n. 4647.
- 85. *Lecania punicea* (Ach.) Müll. Arg. L. B. n. 130; corticola prope Theresopolin: 4654.
- 86. *Callophisma xanthaspis* Müll. Arg. Observ. in Krph. Lich. Argent. n. 66; *Lecanora xanthaspis* Krph. Lich. Argent. n. 66; *Placodium suberinum* Wainio Et. I. p. 123; corticola, prope Theresopolin: n. 4665.
- 87. *Pertusaria commutata* Müll. Arg. L. B. n. 706; corticola ad Theresopolin: n. 4657, ster.
- 88. *Pertusaria pertusella* Müll. Arg. L. B. n. 719; cum praecedente: n. 4663.
- 89. *Pertusaria tetrathalamia v. tetraspora* Müll. Arg. L. B. n. 739; corticola prope Theresopolin: n. 4645.
- — — *f. obfuscata* Müll. Arg. l. c.; cum planta normali.
- 90. *Pertusaria polita* Müll. Arg. L. B. n. 788; corticola ad Theresopolin: n. 4662a.

Trib. Lecideae.

- 91. *Lecidea* (s. *Biatra*) *Piperis* Spreng. in Act. Holm. 1820. p. 467; corticola ad Theresopolin: n. 4661.
- 92. *Patellaria* (s. *Psorothecium*) *sulphurata* Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 52; corticola prope Theresopolin: n. 4660.
- 93. *Patellaria* (s. *Psorothecium*) *versicolor* (Fée) Müll. Arg. Revis. Lich. Féean. p. 5 et L. B. n. 1028; corticola, ad Theresopolin: n. 4666, 4667.
- 94. *Patellaria* (s. *Bombyliospora*) *tuberculosa* (Fée) Müll. Arg. L. B. n. 355 et Revis. Lich. Féean. p. 5; corticola, Theresopolis: n. 4649, 4653.
- 95. *Patellaria* (s. *Bacidia*) *millegrana* (Tayl.) Müll. Arg. L. B. n. 204; corticola ad Theresopolin: n. 4644.
- *v. suffusa* Müll. Arg. L. B. n. 1169; corticola prope Blumenau: n. 4641, 4646, 4677.

- 96. *Patellaria* (s. *Scutula*) *Cladoniarum* Müll. Arg.; apothecia novella fulvo-fusca, dein mox olivaceo-fusca *v. fere olivaceo-nigra*, primum margine leviter pallidiora haud prominente aegreque perspicuo cincta, evoluta diametro $\frac{1}{2}$ mm aequantia, caeterum saepius minora, semper convexa, crassiuscula, opaca, basi contracta, intus primum fusciscenti-obscura, maturiora autem intus undique hyalina; paraphyses conglutinatae; asci oblongati, 8-spori; spores 11—15 μ longae, 3—4 μ latae, digitiformes, utrinque obtusae, rectae aut curvulae, paucae visae 1-loculares (demum verisimiliter 2-loculares). — *A. Scutula Wallrothii* Korb. Par. p. 454 colore et forma apotheciorum differt. — In thallo *Cladoniae ceratophyllae* Eschw., supra saxa muscosa prope Theresopolin crescentis: n. 4530.
- 97. *Heterothecium leucoxanthum* Mass. Essm. p. 17; corticola prope Sitio: n. 4630.
- 98. *Lopadium callichroum* Müll. Arg. L. B. n. 360; muscis instratum prope Theresopolin: n. 4628 (thallus demum hinc inde dactylino farfuraceus evadit).

Trib. Biatrinopsidae.

- 99. *Biatrinopsis latea* Müll. Arg. L. B. n. 254; ad cortices muscosos prope Theresopolin: n. 4652.

Trib. Coenogoniae.

- 100. *Coenogonium Linkii* Ehrenb. Hor. phys. berol. p. 120; ad ramulos prope Theresopolin: n. 4469c.
- 101. *Coenogonium Leprieurii* Nyl. Coenog. n. 1; ramulicola in insula Sta. Catharina: n. 4469d, prope Joinville: n. 4469b, et prope Theresopolin: n. 4469 (spermatogonifera).
- 102. *Coenogonium implexum* Nyl. Coenog. n. 9; prope Theresopolin ad saxa (ut in sched. dicitur, sed forte potius tantum ibidem dejectum): n. 4716, ster.

Trib. Graphideae.

- 103. *Mazoisia rotula* (Montg.) Müll. Arg. Lich. Costar. n. 131 (non Mass.); in foliis Malpighiaceae cujuadam in silvis secus Rio Comprido prope Rio de Janeiro: n. 4991 pr. p.
- 104. *Graphis* (s. *Aulacographa*) *duplicata* Ach. Syn. p. 81; corticola prope Theresopolin: n. 4671.
- 105. *Graphis* (s. *Aulacographa*) *striatula* (Ach.) Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 77; ad ramulos Echitis prope Blumenau: n. 4673.

106. *Graphis* (s. *Aulacogramma*) *rimulosa* (Montg.) Müll. Arg. Lich. Costaric. n. 136; corticola prope Theresopolin: n. 4655, et prope Blumenau: n. 4642.
107. *Graphina* (s. *Rhabdographina*) *chrysocarpa* (Eschw.) Müll. Arg. L. B. n. 153; truncicola in silvis prope Joinville: n. 4648.
108. *Graphina* (s. *Rhabdographina*) *Acharii* Müll. Arg. L. B. n. 1031; corticola prope Theresopolin: n. 4659 pr. p., 4651.
- v. *vestita* Müll. Arg. Graph. Fécen.: p. 39; ad truncos Ciri Aurantium prope Blumenau: n. 4467, et prope Theresopolin: n. 4659, 4656 (haec junior).
109. *Graphina* (s. *Aulacogramma*) *sophistica* (Nyl.) Müll. Arg. L. B. n. 148; corticola prope Theresopolin: n. 4672.
110. *Graphina* (s. *Mesographina*) *contorta* Müll. Arg. Lich. Noaméa p. 5; corticola ad Theresopolin: n. 4662b.
111. *Phaeographina* (s. *Eleutheroloma*) *caesio-pruinosa* (Fée) Müll. Arg. Graphid. Fécen. p. 49; corticola prope Blumenau: n. 4676.
112. *Arthonia gregaria* v. *purpurea* Müll. Arg.; *Conioluma coccineum* v. *purpureum* Eschw. Bras. p. 170; ad truncos prope Blumenau: n. 4675.
113. *Chiodecton sanguineum* (Sw.) Wainio Et. II. p. 143; *Ch. rubro-cinctum* Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 110; ad truncos et ad muros vetustos prope Theresopolin: n. 4618; in Coreovado: n. 4622, ambo ster.
114. *Glyphia confluenta* Zenck. f. *analogia* Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 573; ad truncos arborum prope Blumenau: n. 4674.

Trib. Coreae.

115. *Cora Paysonia* Fr. Epier. p. 556; ad truncos arborum prope Blumenau: n. 4483, in declivitatibus argillaceis prope Theresopolin: n. 4470, 4483 d pr. p., ad terram argillaceam et ad saxa in Serra do Pie; n. 4483e, et supra muscos infra caecumen montis Itacolomi: n. 4619.
116. *Cora reticulifera* Wainio Et. II. p. 241; inter muscos et ad saxa prope Blumenau: n. 4483b; frequens ad terram secus viam supra Joinville: n. 4483c, et similiter frequens ad declivitates argillaceas in Serra dos Orgaos: n. 4483d pr. p., et ad saxa prope Ouro Preto: n. 4483f.

Trib. Dichonemeae.

117. *Dichonema sericeum* (Sw.) Montg. in Béloug. Voy. p. 155 t. 14. Fig. 1; ad arbores silvarum prope Blumenau: n. 4626; circa Mannaos ad flumen Amazonum: n. 4625 (fragm. ex hb. Schwacke).
118. *Laudatea Schenckiana* Müll. Arg.; thallus saturate aeruginoso-viridis, vage subparallelo-decumbens, non fasciculatum caespitosus, leviter nitidus; filaments 2—3 mm longa, cum vaginis rectangulari-undulato-cellulosis circ. 23—28 μ lata, abaque vaginis 19—24 μ lata; hyphae diametro 5—6 μ aequantes; fructificatio ignota. — Structura ut in praecedente, et a *Laudatea caespitosa* Johow. in eo diversa quod thallus subadpresso-decumbens, nec caespitoso-fascicularis. — Ad arborum truncos prope Theresopolin: n. 4627.

Trib. Striguleae.

119. *Strigula elegans* v. *Féei* Müll. Arg. Pyrenoc. Cubens. p. 380; in foliis Maragravinae prope Blumenau: n. 4994 (pycnides), et ibidem in foliis Piperis: n. 4992.
- v. *intermedia* Müll. Arg. l. c., follicola in silvis ad Rio Comprido prope Rio de Janeiro: n. 4991.

Trib. Pyrenuleae.

120. *Bathelium irregulare* Müll. Arg.; thallus flavido-testaceus, tenuis, mox verrucoso-inaequalis et in verrucas concolores demum alte convexas suborbiculares circ. 2 mm latus aut saepius irregulares et gibbosas saepeque varie confluentes monocarpicas abiens; ostiolum parvum in depressione levi situm, demum annulo excorticate angustissimo cinctum; perithecium regulare, completum, in collum brevem abiens, undique nigrum et omnino inclusum; nucleus albus (demum morbose nigricans); spores 140—180 μ longae, 30—40 μ latae, valde parenchymaticae, juniores 8-nae, evolutae autem in ascis fugacibus pauciores. — Juxta *B. gigantesporum* Müll. Arg. Pyrenoc. Cub. p. 394 locandum est, a quo recedit verrucis valde irregularibus, ostioliis parvis et sporis minoribus. — Ad truncos arborum prope Theresopolin: n. 4643 (specimina parum bona).
121. *Trypethelium Eluteriae* Sprengl. Anleit. p. 351; corticola prope Blumenau: n. 4468.